

Bolest', o ktorej sa nehovorí

Potrat je riešenie, ktoré zanechá v mnohých trvalú stopu. Môžu ním byť poznačené nielen ženy, ale aj otcovia, súrodenci, celé rodiny a generácie. Prináša so sebou negatívne dôsledky na fyzický a psychický život ženy. Žena môže stratiť oveľa viac, ako predpokladala.

„Som nahnevaná. Hnevám sa na každú ženu, ktorá mala potrat a nepovedala mi o tejto bolesti. Akoby vytvorili tajný spolok – sprisahanie, že si nebudú rozprávať o terore sebaobviňovania a nenávisti voči sebe. Potrat sa nepodobá odstraňovaniu bradavíc ani manikúre, ani novému účesu. Každý, kto vám tvrdí niečo iné, je klamár alebo ešte horšie.“

Z listu ženy po potrate v knihe Zakázaný žiaľ'

„**Postabortívny (popotratový) syndróm (PAS)** je oneskorený alebo pomaly sa rozvíjajúci chronický syndróm žiaľu.“

Psychiater Dr. E. Seal

- ✓ Vedci vo Fínsku zistili, že v celej populácii žien, ktoré podstúpili interrupciu, môže byť v nasledujúcom roku triapolkrát vyššia úmrtnosť pre samovraždy, nehody a vraždy. GISSLER, M., C. BERG a P. BUEKENS, 2005.
- ✓ Z dlhodobej štúdie o amerických ženách vyplynulo, že u žien, ktoré podstúpili interrupciu, je o 65% vyššie riziko dlhodobej klinickej depresie. REARDON, D. C. a J. R. COUGLE, 2002.
- ✓ Z analýzy lekárskeho záznamov 56 741 pacientov vyplynulo, že ženy po interrupcii boli o 160 % častejšie hospitalizované pre psychiatrickú liečbu ako ženy, ktoré porodili dieťa. Hodnotenie prebehlo v období od 90 dní do 4 rokov po interrupcii alebo po pôrode. REARDON, D. C., J. R. COUGLE, V. M. RUE a M. W. SHUPING, 2003.
- ✓ Priscilla Coleman a jej tím zistili, že deti žien, ktoré podstúpili potrat, majú menej priaznivé domáce prostredie a problémovjšie správanie než deti žien bez potratu. Toto zistenie podporuje názor, že potrat môže negatívne ovplyvniť vzťah s ďalšími deťmi a psychickú stabilitu ženy. COLEMAN, P. K., D. C. REARDON a J. R. COUGLE, 2002.

Existuje cesta z bolesti k nádeji

viac informácií na: rachel.rodinabb.sk, alexisporadna.sk